

2022 秋季学期

1 (12 分) 填空题

(1) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 6 & \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & -8 \end{pmatrix}$ 则其范数 $\|A\|_1 =$ _____, $\|A\|_\infty =$ _____, 谱半径 = _____; 若利用 Householder 变换求该矩阵的 QR 分解, 则 $Q =$ _____, $R =$ _____。

(2) 将线性规划问题

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2, x_3} z &= 2x_1 + x_2 - 4x_3 \\ \text{subject to: } & -x_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ & -2x_1 + x_2 - x_3 \leq 6, \\ & x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 无约束。} \end{aligned}$$

化为标准形式。

2 (13 分)

在线性空间 $\mathbf{P}_1[x] = \text{span}\{1, x\}$ 中, 求 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的:

(1) 一次最佳平方逼近多项式 (设权函数为 1); (2) 一次最佳一致逼近多项式。

3 (10 分)

给定线性方程组 $Ax = b$, 其中 A 可逆, D 为 A 的对角元构成的对角阵, 在 Jacobi 迭代法中引入迭代参数 $\omega > 0$, 即:

$$x_{k+1} = x_k - \omega D^{-1}(Ax_k - b)$$

称之为 Jacobi 松弛法 (简称 JOR 方法), 证明: 若此时 Jacobi 迭代法收敛且 $0 < \omega < 1$, 则 JOR 方法收敛。

4 (15 分)

(1) 构造一个次数不高于三次的多项式 $H(x) \in \mathcal{P}_3[x]$, 使之满足

$$H(x_i) = f(x_i), H'(x_i) = f'(x_i), i = 0, 1$$

其中 $a \leq x_0 \leq x_1 \leq b$ 。

(2) 给定节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 上的函数 $f(x_i) (i = 0, 1, \cdots, n)$ 及一阶导数值 $f'(x_i) (i = 0, 1, \cdots, n)$, 设 $H(x) \in \mathcal{P}_{2n+1}[x]$ 为相应的 Hermite 插值多项式, 即 $H(x)$ 满足 $H(x_i) = f(x_i), H'(x_i) = f'(x_i), i = 0, 1, \cdots, n$ 且 $f(x)$ 充分光滑,

证明: 此时插值误差 $R(x) = f(x) - H(x)$ 满足

$$R(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi(x))}{(2n+2)!} [w_{n+1}(x)]^2,$$

其中 $w_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x-x_i), \xi(x) \in (x_0, x_n)$ 。(注: 不可利用差商与导数的关系式)

5 (10 分)

考虑用 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 求非线性函数 $f(x)$ 的单重根 s 。其中 $\varphi(x) = x - a(x)f(x) + b(x)f^2(x)$ 。试确定一组 $a(x)$ 和 $b(x)$ 使得该迭代公式在根 s 附近至少是三阶收敛的。

6 (15 分)

(1) 用 LU 分解求解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 10 \end{cases}$$
, 其中 L 是

单位下三角矩阵, U 是上三角矩阵。

(2) 设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$ 是严格对角占优矩阵, 即 A 满足

$$|a_{kk}| > \sum_{j=1, j \neq k}^n |a_{jk}|, k = 1, 2, \dots, n,$$

证明: 对 $Ax = b$ 用 Gauss 顺序消元法得到的上三角阵方程组与用 Gauss 列主元消元法得到的上三角阵方程组是完全相同的。

7 (15 分)

设 $f(x)$ 充分可微, 设有数值积分公式

$$\int_{-2}^2 \omega(x)f(x)dx = Af(x_0) + Bf(x_1)$$

其中 $\omega(x) = (4 - x^2)^{-0.5}$ 。

(1) 试确定常数 A, B, x_0, x_1 使其达到最高阶的代数精度; 给出此时的代数精度。

(2) 试求第一问中数值积分公式的截断误差。

8 (10 分)

设二元函数 $f(x, y)$ 在 $a \leq x \leq b, -\infty < y < \infty$ 上连续, 且对 y 满足 Lipschitz 条件, 即 $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$, 设常微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & a \leq x \leq b \\ y(a) = y_0. \end{cases}$$

的精确解为 $y(x) \in C^2[a, b]$, 且满足 $|y''(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$ (这里的 $M > 0$ 为常数)。对区间 $[a, b]$ 作等距划分, 记步长为 $h = \frac{b-a}{n}, x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n, n \geq 2$ 为正整数。考虑用向前 Euler 公式解此初值问题, 记 y_i 为 $x_i (i = 1, \dots, n)$ 处的数值解。

- (1) 写出向前 Euler 公式;
- (2) 若不考虑计算机舍入误差, 试证明:

$$|y(x_n) - y_n| \leq \frac{hM}{2L}(e^{L(b-a)} - 1).$$