

# 1 第一章

问题(六). 设 $u = u(x, y, z)$ , 求下列方程的通解:

$$(1) \quad u_y + a(x, y)u = 0;$$

$$(2) \quad u_{xy} + u_y = 0;$$

$$(3) \quad u_{tt} = a^2 u_{xx} + 3x^2.$$

解. (1) 注意到 $0 = e^{\int_0^y a(x, y) dy}(u_y + a(x, y)u) = (e^{\int_0^y a(x, y) dy}u)_y$ 。所以

$$e^{\int_0^y a(x, y) dy}u = f(x, z).$$

所以

$$u = e^{-\int_0^y a(x, y) dy}f(x, z).$$

$$(2) \quad (u_x + u)_y = 0。 \text{ 所以 } u_x + u = f(x, z)。 \text{ 即}$$

$$(e^x u)_x = f(x, z).$$

所以

$$e^x u = \int f(x, z) dx + g(y, z).$$

$$\text{所以 } u = e^{-x}(\int f(x, z) dx + g(y, z))。$$

$$(3) \quad \text{如果 } a \neq 0, \text{ 特解 } v = -\frac{x^4}{4a^2}。 \text{ 设 } w = u - v, \text{ 则}$$

$$w_{tt} = a^2 w_{xx}$$

得到

$$w = f(x + at) + g(x - at).$$

$$\text{所以通解 } u = f(x + at) + g(x - at) - \frac{x^4}{4a^2}。$$

如果 $a = 0$ ,

$$u = \frac{3x^2 t^2}{2} + g(x) + th(x).$$

问题(十二). 求一端固定的半无界弦振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0 \\ u(0, x) = \sin x, & u_t(0, x) = kx \\ u(t, 0) = 0. & \end{cases}$$

解. 端点固定 ( $u(t, 0) = 0$ ) 做奇延拓, 端点自由运动 ( $u_x(t, 0) = 0$ ) 做偶延拓, 这里0点固定, 因而奇延拓。新的定解问题为

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ v(0, x) = \sin x, & v_t(0, x) = kx \\ v(t, 0) = 0. & \end{cases}$$

由达朗贝尔公式

$$u(t, x) = v(t, x)|_{x \geq 0} = \frac{\sin(x + at) + \sin(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} ksds = \sin(x) \cos(at) + 2kxt.$$

问题. 求解一维弦得振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - 4t + 2x, -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(0, x) = x^2, u_t(0, x) = \sin(3x) \end{cases}$$

解. 达朗贝尔公式要求方程齐次, 取泛定方程得一个特解  $v(t, x) = -\frac{2t^3}{3} + xt^2$ 。设  $w = u - v$ , 得

$$\begin{cases} w_{tt} = w_{xx}, -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ w(0, x) = x^2, w_t(0, x) = \sin(3x). \end{cases}$$

由达朗贝尔公式

$$w = \frac{(x-t)^2 + (x+t)^2}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \sin(3s) ds = x^2 + t^2 + \frac{1}{3} \sin(3x) \sin(3t).$$

所以

$$u(t, x) = w + v = x^2 + t^2 - \frac{2t^3}{3} + xt^2 + \frac{1}{3} \sin(3x) \sin(3t)$$

## 2 第二章

3. 一条均匀的弦固定于  $x = 0$  及  $x = l$ , 在开始的一瞬间, 它的形状是一条以  $(\frac{l}{2}, h)$  为顶点的抛物线, 初速度为零, 且没有外力作用, 求弦的位移函数。

解. 定解问题为:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, x) = \frac{4h}{l^2} x(l-x), u_t(0, x) = 0 \\ u(t, 0) = 0, u(t, l) = 0 \end{cases}$$

分离变量, 假设

$$u(t, x) = T(t)X(x).$$

带入泛定方程可得

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

上式左边为  $t$  的函数, 右边为  $x$  的函数, 因而肯定为常值, 设为  $-\lambda$ 。从而我们得到以下固有值问题:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, 0 < x < l \\ X(0) = 0, X(l) = 0. \end{cases}$$

以及

$$T''(t) + \lambda a^2 T = 0.$$

分情况讨论:

(1)  $\lambda < 0$  时,  $X = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$ 。带入边界条件得到  $C_1 = C_2 = 0$ 。舍去。

(2)  $\lambda = 0$  时,  $X = C_1 x + C_2$ 。带入边界条件得到  $C_1 = C_2 = 0$ 。舍去。

(3)  $\lambda > 0$  时,  $X = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$ 。带入边界条件带入边界条件

$$\begin{cases} C_1 = 0, \\ C_1 \cos(\sqrt{\lambda}l) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0. \end{cases}$$

得到  $C_1 = 0$  以及

$$\sqrt{\lambda}l = n\pi, n = 1, 2, 3 \dots$$

固有值和固有函数为:

固有值:  $\lambda_n = (\frac{n\pi}{l})^2$  对应固有函数:  $X_n = \sin(\frac{n\pi x}{l}), n = 1, 2, 3 \dots$

固定  $\lambda_n$ , 则可以得到对应  $T_n$  的常微分方程:

$$T_n'' = -\lambda_n a^2 T_n = -(\frac{n\pi a}{l})^2 T_n.$$

解得

$$T_n(t) = A_n \cos(\frac{n\pi at}{l}) + B_n \sin(\frac{n\pi at}{l}), n = 1, 2 \dots$$

整理得原定解问题的解为

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( A_n \cos(\frac{n\pi at}{l}) + B_n \sin(\frac{n\pi at}{l}) \right) \sin(\frac{n\pi x}{l}).$$

由初始条件

$$u_t(0, x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n n\pi a \sin(\frac{n\pi x}{l}) = 0.$$

所以  $B_n = 0$ 。展开  $u(0, x)$

$$\frac{4h}{l^2} x(l-x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n X_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(\frac{n\pi x}{l}).$$

其中

$$c_n = \frac{\langle \varphi, X_n \rangle}{\langle X_n, X_n \rangle} = \frac{2}{l} \int_0^l \frac{4h}{l^2} s(l-s) \sin(\frac{n\pi s}{l}) ds = \frac{16h((-1)^n - 1)}{(n\pi)^3}.$$

当  $n$  为奇数得时候  $c_n = \frac{32h}{(n\pi)^3}$ , 当  $n$  为偶数时,  $c_n = 0$ 。所以

$$u(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{32h}{(2n+1)^3 \pi^3} \cos(\frac{(2n+1)\pi at}{l}) \sin(\frac{(2n+1)\pi x}{l})$$

5.(3)

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} - 2hu_t, (0 < x < l, t > 0, 0 < h < \frac{\pi a}{l}, h \text{ 为常数}), \\ u(t, 0) = u(t, l) = 0, \\ u(0, x) = \varphi(x), u_t(0, x) = \psi(x). \end{cases}$$

解. 分离变量, 假设  $u(t, x) = T(t)X(x)$ . 带入泛定方程可得

$$\frac{T'' + 2hT'}{a^2T} = \frac{X''}{X}.$$

上式左边为  $t$  的函数, 右边为  $x$  的函数, 因而肯定为常值, 设为  $-\lambda$ . 从而我们得到以下固有值问题:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < l \\ X(0) = 0, X(l) = 0. \end{cases}$$

以及

$$T''(t) + 2hT' + \lambda a^2T = 0.$$

解固有值问题得到固有值和固有函数为:

$$\text{固有值: } \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \text{ 对应固有函数: } X_n = \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right).$$

固定  $\lambda_n$ , 则可以得到对应  $T_n$  的常微分方程:

$$T_n''(t) + 2hT_n' + \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 a^2 T_n = 0.$$

解得

$$T_n(t) = e^{-ht} \left( A_n \cos\left(\sqrt{\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 - h^2} t\right) + B_n \sin\left(\sqrt{\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 - h^2} t\right) \right), n = 1, 2, \dots.$$

整理得原定解问题的解为

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-ht} \left( A_n \cos\left(\sqrt{\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 - h^2} t\right) + B_n \sin\left(\sqrt{\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 - h^2} t\right) \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right).$$

其中

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(s) \sin\left(\frac{n\pi s}{l}\right) ds, \\ B_n &= \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 - h^2}} \left( h a_n + \frac{2}{l} \int_0^l \psi(s) \sin\left(\frac{n\pi s}{l}\right) ds \right). \end{aligned}$$

5.(6) 环域内的狄利克莱问题:

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0, & (a < r < b), \\ u(a, \theta) = 1, u(b, \theta) = 0. \end{cases}$$

解. 容易看出  $u$  与  $\theta$  无关, 不妨设  $u = u(r)$ , 所以

$$\Delta_2 u = u_{rr} + \frac{u_r}{r} = u'' + \frac{u'}{r} = 0.$$

做变量替换  $r = e^t$  得到

$$\frac{d^2 u}{dt^2} = 0.$$

所以  $u = A + Bt = A + B \ln r$ . 带入边界条件得

$$A + B \ln a = 1, A + B \ln b = 0.$$

解得:  $A = -\frac{\ln b}{\ln a - \ln b}$ ,  $B = \frac{1}{\ln a - \ln b}$ 。所以

$$u = \frac{\ln r - \ln b}{\ln a - \ln b}.$$

8. 一个半径为  $a$  的半圆形平板, 其圆周边界上的温度保持  $u(a, \theta) = T\theta(\pi - \theta)$ , 而直径边界上的温度为零度, 板的上下侧面绝热, 试求板内的温度分布。

解. 写出定解问题

$$\begin{cases} \Delta_2 u = u_{rr} + \frac{u_r}{r} + \frac{u_{\theta\theta}}{r^2} = 0, & 0 < r < a, 0 < \theta < \pi \\ u(a, \theta) = T\theta(\pi - \theta) \\ u(r, 0) = u(r, \pi) = 0 \end{cases}$$

分离变量, 设  $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ , 则有

$$-\frac{r^2 R'' + rR'}{R} = \frac{\Theta''}{\Theta}$$

为常数, 设为  $-\lambda$ , 得到固有值问题

$$\begin{cases} \Theta'' + \lambda\Theta = 0, & 0 < \theta < \pi \\ \Theta(0) = \Theta(\pi) = 0. \end{cases}$$

解得固有值及对应固有函数:  $\lambda_n = n^2$ ,  $\Theta_n = \sin(n\theta)$ ,  $n = 1, 2, 3 \dots$ . 将固有值带入  $R$  得微分方程

$$r^2 R''_n + rR'_n - n^2 R_n = 0,$$

做变量替换  $r = e^t$ , 得

$$\frac{d^2 R}{dt^2} - n^2 R = 0.$$

解之, 得

$$R_n = C_{n,1}e^{nt} + C_{n,2}e^{-nt} = C_{n,1}r^n + C_{n,2}r^{-n}, n = 1, 2, 3 \dots$$

注意到  $|R(0)| < \infty$  得

$$R_n = C_n r^n, n = 1, 2, 3 \dots$$

从而

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(n\theta) r^n.$$

求系数, 将  $T\theta(\pi - \theta)$  按正弦函数分解:

$$T\theta(\pi - \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8T_0}{(2n+1)^3 \pi} \sin((2n+1)\theta).$$

对照得  $C_{2n} = 0$ ,  $C_{2n+1} = \frac{8T_0}{(2n+1)^3 \pi a^{2n+1}}$ 。所以

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8T_0}{(2n+1)^3 \pi} \left(\frac{r}{a}\right)^{2n+1} \sin((2n+1)\theta).$$

1. 解下列固有值问题

(1).

$$\begin{cases} y'' - 2ay' + \lambda y = 0, & 0 < x < l, a = \text{constant}, \\ y(0) = y(l) = 0. \end{cases}$$

解. 化为

$$\begin{cases} [e^{-2ax}y']' + e^{-2ax}\lambda y = 0, & 0 < x < l, a = \text{constant}, \\ y(0) = y(l) = 0. \end{cases}$$

由SL 理论, 零不是固有值, 且固有值大于零。解方程 $t^2 - 2at + \lambda = 0$ , 得 $t = a \pm \sqrt{a^2 - \lambda}$ 。如果 $\lambda < a^2$ , 解之, 舍去。如果 $\lambda = a^2$ , 解之, 舍去。如果 $\lambda > a^2$ ,  $y = C_1 e^{ax} \cos(\sqrt{\lambda - a^2}x) + C_2 e^{-ax} \sin(\sqrt{\lambda - a^2}x)$ 。代入边界条件, 得 $C_1 = 0$ ,  $\sin(\sqrt{\lambda - a^2}l) = 0$ 。得

$$\sqrt{\lambda - a^2}l = n\pi, n = 1, 2, \dots.$$

固有值 $\lambda_n = a^2 + \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$ , 固有函数 $y_n = e^{ax} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), n = 1, 2, \dots$

问题. 求固有值问题:

$$\begin{cases} y'' + 2y' + \lambda y = 0, & 0 < x < 9, \\ y(0) = y(9) = 0. \end{cases}$$

解. 化为

$$\begin{cases} [e^{2x}y']' + e^{2x}\lambda y = 0, & 0 < x < 9, \\ y(0) = y(9) = 0. \end{cases}$$

由SL 理论, 零不是固有值, 且固有值大于零。解方程 $t^2 + 2t + \lambda = 0$ ,  $\lambda \leq 1$  讨论可以舍去,  $\lambda > 1$  时得 $t = -1 \pm \sqrt{\lambda - 1}i$ 。所以 $y = C_1 e^{-x} \cos(\sqrt{\lambda - 1}x) + C_2 e^{-x} \sin(\sqrt{\lambda - 1}x)$ 。代入边界条件, 得 $C_1 = 0$ ,  $\sin(9\sqrt{\lambda - 1}) = 0$ 。得

$$9\sqrt{\lambda - 1} = n\pi, n = 1, 2, \dots.$$

固有值 $\lambda_n = 1 + \left(\frac{n\pi}{9}\right)^2$ , 固有函数 $y_n = e^{-x} \sin\left(\frac{n\pi x}{9}\right), n = 1, 2, \dots$

(2).

$$\begin{cases} [r^2 R']' + \lambda r^2 R = 0, & 0 < r < a, \\ |R(0)| < \infty, R(a) = 0; [\text{提示: } y = rR] \end{cases}$$

解. 由提示做因变量替换 $y = rR$ , 则 $R = y/r$ 。

$$[r^2 R']' + \lambda r^2 R = [r^2(y/r)']' + \lambda yr = ry'' + \lambda ry = 0.$$

即

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < r < a, \\ |y(0)| = 0, y(a) = 0. \end{cases}$$

固有值和对应固有函数为 $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2$ ,  $R_n = y_n/r = \frac{1}{r} \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right), n = 1, 2, \dots$

(3).

$$\begin{cases} y^{(4)} + \lambda y = 0, 0 < x < l, \\ y(0) = y(l) = y''(0) = y''(l) = 0. \end{cases}$$

解. 解特征方程:  $\mu^4 + \lambda = 0$ 。分情况讨论:如果  $\lambda = 0$ , 有四重根 0, 解为  $y = C_0 + C_1x + C_2x^2 + C_3x^3$ , 带入边界条件得  $C_0 = C_1 = C_2 = C_3 = 0$ , 舍去。如果  $\lambda < 0$ , 有根  $\mu_1 = |\lambda|^{1/4}$ ,  $\mu_2 = -|\lambda|^{1/4}$ ,  $\mu_3 = |\lambda|^{1/4}i$ ,  $\mu_4 = -|\lambda|^{1/4}i$ 。微分方程得解为

$$y = C_0 \exp(|\lambda|^{1/4}x) + C_1 \exp(-|\lambda|^{1/4}x) + C_2 \cos(|\lambda|^{1/4}x) + C_3 \sin(|\lambda|^{1/4}x).$$

带入边界条件

$$\begin{cases} C_0 + C_1 + C_2 = 0 \\ C_0 \exp(|\lambda|^{1/4}l) + C_1 \exp(-|\lambda|^{1/4}l) + C_2 \cos(|\lambda|^{1/4}l) + C_3 \sin(|\lambda|^{1/4}l) = 0 \\ C_0 |\lambda|^{1/2} + C_1 |\lambda|^{1/2} - C_2 |\lambda|^{1/2} = 0 \\ C_0 |\lambda|^{1/2} \exp(|\lambda|^{1/4}l) + C_1 |\lambda|^{1/2} \exp(-|\lambda|^{1/4}l) - C_2 |\lambda|^{1/2} \cos(|\lambda|^{1/4}l) - C_3 |\lambda|^{1/2} \sin(|\lambda|^{1/4}l) = 0 \end{cases}$$

解之,  $C_0 = C_1 = C_2 = 0$ ,  $C_3 \sin(|\lambda|^{1/4}l) = 0$ 。当

$$|\lambda|^{1/4}l = n\pi, n = 1, 2, 3, \dots$$

有非零解。固有值  $\lambda_n = -(\frac{n\pi}{l})^4$ , 固有函数  $y_n = \sin(\frac{n\pi x}{l}), n \geq 1$ .如果  $\lambda > 0$ , 有根  $\mu_1 = |\lambda|^{1/4} \exp(\frac{\pi i}{4})$ ,  $\mu_2 = |\lambda|^{1/4} \exp(\frac{3\pi i}{4})$ ,  $\mu_3 = |\lambda|^{1/4} \exp(\frac{5\pi i}{4})$ ,  $\mu_4 = |\lambda|^{1/4} \exp(\frac{7\pi i}{4})$ 。微分方程得解为

$$y = C_1 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{\pi i}{4})x} + C_2 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{3\pi i}{4})x} + C_3 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{5\pi i}{4})x} + C_4 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{7\pi i}{4})x}.$$

带入边界条件

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = 0 \\ C_1 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{\pi i}{4})l} + C_2 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{3\pi i}{4})l} + C_3 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{5\pi i}{4})l} + C_4 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{7\pi i}{4})l} \\ C_1 - C_2 + C_3 - C_4 = 0 \\ C_1 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{\pi i}{4})l} - C_2 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{3\pi i}{4})l} + C_3 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{5\pi i}{4})l} - C_4 e^{|\lambda|^{1/4} \exp(\frac{7\pi i}{4})l} \end{cases}$$

解得  $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 0$ , 舍去。

10. 解下列非齐次固有值问题:

(2)

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, a = constant > 0, \\ u(t, 0) = 0, u_x(t, l) = -\frac{q}{k} \\ u(0, x) = u_0. \end{cases}$$

并求  $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t, x)$ 。

解. 定解问题非齐次, 首先齐次化: 取  $v(t, x) = -\frac{q}{k}x$ , 设  $w = u - v$  得到

$$\begin{cases} w_t = a^2 w_{xx}, 0 < x < l, a = \text{constant} > 0, \\ w(t, 0) = 0, w_x(t, l) = 0 \\ w(0, x) = u_0 + \frac{q}{k}x. \end{cases}$$

分离变量, 设  $w = T(t)X(x)$ , 得

$$\frac{T'}{T} = \frac{X''}{X}.$$

设上式为  $-\lambda$  得固有值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = 0, X'(0) = 0. \end{cases}$$

解之, 固有值为  $\lambda_n = (\frac{(2n-1)\pi}{2l})^2$ , 固有函数为  $X_n = \sin(\frac{(2n-1)\pi x}{2l})$ ,  $n \geq 1$ 。解常微分方程

$$T'_n + \lambda_n a^2 T_n = 0$$

得  $T_n = \exp(-(\frac{(2n-1)\pi a}{2l})^2 t)$ 。所以

$$w(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \exp\left(-\left(\frac{(2n-1)\pi a}{2l}\right)^2 t\right) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right).$$

将  $w(0, x) = u_0 + \frac{q}{k}x$  分解得:

$$u_0 + \frac{q}{k}x = \left( \frac{4u_0}{(2n-1)\pi} - \frac{(-1)^n 8ql}{k[(2n-1)\pi]^2} \right) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right).$$

对照得

$$w(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{4u_0}{(2n-1)\pi} - \frac{(-1)^n 8ql}{k[(2n-1)\pi]^2} \right) \exp\left(-\left(\frac{(2n-1)\pi a}{2l}\right)^2 t\right) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right).$$

最终

$$u = v + w = -\frac{q}{k}x + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{4u_0}{(2n-1)\pi} - \frac{(-1)^n 8ql}{k[(2n-1)\pi]^2} \right) \exp\left(-\left(\frac{(2n-1)\pi a}{2l}\right)^2 t\right) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right).$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t, x) = -\frac{q}{k}x.$$

(5)

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + g, g \text{ 为常数,} \\ u(t, 0) = 0, u_x(t, l) = E \\ u(0, x) = Ex, u_t(0, x) = 0. \end{cases}$$

解. 取  $\tilde{u}(t, x) = xE$  及  $w = u - \tilde{u}$ 。得到定解问题

$$\begin{cases} w_{tt} = w_{xx} + g, \\ w(t, 0) = 0, w_x(t, l) = 0 \\ w(0, x) = 0, w_t(0, x) = 0. \end{cases}$$

令 $\tilde{w} = \frac{g}{2}x(2l - x)$  及 $v = w - \tilde{w}$  得:

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{xx}, \\ v(t, 0) = 0, v_x(t, l) = 0 \\ v(0, x) = -\frac{g}{2}x(2l - x), v_t(0, x) = 0. \end{cases}$$

分离变量, 我们假设

$$v(t, x) = T(t)X(x).$$

带入泛定方程可得

$$\frac{T''}{T} = \frac{X''}{X}.$$

上式左边为 $t$ 的函数, 右边为 $x$ 的函数, 因而肯定为常值, 设为 $-\lambda$ 。从而我们得到以下固有值问题:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, 0 < x < l \\ X(0) = 0, X'(l) = 0. \end{cases}$$

以及

$$T''(t) + \lambda a^2 T = 0.$$

解得固有值和固有函数为:

$$\text{固有值: } \lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2 \text{ 对应固有函数: } X_n = \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right), n \geq 1.$$

固定 $\lambda_n$ , 则可以得到对应 $T_n$ 的常微分方程:

$$T_n'' = -\lambda_n T_n = -\left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2 T_n.$$

解得

$$T_n(t) = A_n \cos\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2l}\right) + B_n \sin\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2l}\right), n = 0, 1, 2 \dots$$

整理得

$$v(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( A_n \cos\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2l}\right) + B_n \sin\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2l}\right) \right) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right).$$

最后一步, 确定 $A_n$ 和 $B_n$ 的取值。对 $\varphi(x)$ 做展开

$$-\frac{g}{2}x(2l - x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n X_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right).$$

其中

$$c_n = \frac{\langle -\frac{g}{2}x(2l - x), X_n \rangle}{\langle X_n, X_n \rangle} = -\frac{g}{l} \int_0^l x(2l - x) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi s}{2l}\right) ds = -\frac{16gl^2}{(2n-1)^3 \pi^3}.$$

令 $t = 0$ 并对照, 我们可以得到:

$$\begin{cases} A_n = -\frac{16gl^2}{(2n-1)^3 \pi^3} \\ B_n = 0. \end{cases}$$

所以

$$v(t, x) = -\frac{16gl^2}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3} \cos\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2l}\right) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right).$$

定解问题的解为

$$u = \tilde{u} + \tilde{w} + v = Ex + \frac{g}{2}x(2l-x) - \frac{16gl^2}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3} \cos\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2l}\right) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right).$$

12. 设  $\omega_n$  是  $J_0(2\omega) = 0$  的正实根, 把函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1 \\ 0.5, & x = 1 \\ 0, & 1 < x < 2 \end{cases}$$

展开成  $J_0(\omega_n x)$  的级数。

解.  $\omega_n^2$  以及  $J_0(\omega_n x)$  为对应如下零阶贝塞尔固有值问题的固有值和固有函数

$$\begin{cases} x^2y'' + xy' + \mu x^2y = 0, 0 < x < 2 \\ |y(0)| < \infty, y(2) = 0. \end{cases}$$

边界条件为 I 类边界条件, 所以  $\mathcal{N}_{0,n}^2 = 2J_1^2(2\omega_n)$ 。

首先求

$$\langle f(x), J_0(\omega_n x) \rangle = \int_0^1 J_0(\omega_n x) x dx = \frac{1}{\omega_n^2} \int_0^{\omega_n} J_0(x) x dx = \frac{1}{\omega_n^2} \int_0^{\omega_n} (x J_1(x))' dx = \frac{J_1(\omega_n)}{\omega_n}.$$

从而

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle f(x), J_0(\omega_n x) \rangle}{\mathcal{N}_{0,n}^2} J_0(\omega_n x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\omega_n)}{2\omega_n J_1^2(2\omega_n)} J_0(\omega_n x).$$

13. 设  $\omega_n$  是  $J_1(\omega) = 0$  的正实根, 把函数  $f(x) = x, 0 < x < 1$  展开成  $J_1(\omega_n x)$  的级数。

解.  $\omega_n^2$  以及  $J_1(\omega_n x)$  为对应如下 1 阶贝塞尔固有值问题的固有值和固有函数

$$\begin{cases} x^2y'' + xy' + (\mu x^2 - 1)y = 0, 0 < x < 1 \\ |y(0)| < \infty, y(1) = 0. \end{cases}$$

边界条件为 I 类边界条件, 所以  $\mathcal{N}_{1,n}^2 = \frac{J_2^2(\omega_n)}{2} = \frac{1}{2} \left( \frac{2J_1(\omega_n)}{x} - J_0(\omega_n) \right)^2 = \frac{J_0^2(\omega_n)}{2}$ 。

首先求

$$\langle x, J_1(\omega_n x) \rangle = \int_0^1 J_1(\omega_n x) x^2 dx = \frac{1}{\omega_n^3} \int_0^{\omega_n} J_1(x) x^2 dx = \frac{1}{\omega_n^3} \int_0^{\omega_n} (x^2 J_2(x))' dx = \frac{J_2(\omega_n)}{\omega_n} = -\frac{J_0(\omega_n)}{\omega_n}.$$

从而

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle x, J_1(\omega_n x) \rangle}{\mathcal{N}_{1,n}^2} J_1(\omega_n x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\omega_n J_0(\omega_n)} J_1(\omega_n x).$$

16. 半径为  $R$  的无限长圆柱的侧表面保持一定的温度  $u_0$ , 柱子内的初始温度为 0, 内部无热源, 求柱子内的温度分布变化?

解. 由对称性, 容易知道温度分布与角度无关, 与  $z$  无关, 不妨设温度  $u = u(t, r)$ 。因而可以写出定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 \left( \frac{\partial u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right), & 0 < r < R, t > 0. \\ u|_{r=R} = u_0, u(0, r) = 0. \end{cases}$$

首先边界条件齐次化, 设  $v = u - u_0$ , 得到

$$\begin{cases} v_t = a^2 \left( \frac{\partial v}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} \right), & 0 < r < R, t > 0. \\ v|_{r=R} = 0, v(0, r) = -u_0. \end{cases}$$

分离变量,  $v(r, z) = \mathcal{R}(r)T(t)$ , 有

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{r \mathcal{R}'' + \mathcal{R}'}{r \mathcal{R}}.$$

设上式为常值  $-\mu$ , 得到固有值问题

$$\begin{cases} r^2 \mathcal{R}'' + r \mathcal{R}' + \mu r^2 \mathcal{R} = 0, & 0 < r < R \\ |\mathcal{R}(0)| < \infty, \mathcal{R}(R) = 0. \end{cases}$$

这是零阶的贝塞尔固有值问题, 因为有一个边界条件是 I 类边界条件。因而零不是固有值, 设

$$J_0(\omega R)$$

的所有正解为  $0 < \omega_1 < \omega_2 < \dots$ 。则对应固有值  $\omega_n^2$ , 固有函数  $J_0(\omega_n r)$ , 将固有值带入  $T_n$  的方程, 得到:

$$T'_n + a^2 \omega_n^2 T_n = 0.$$

$T_n = A_n e^{-a^2 \omega_n^2 t}$ 。从而

$$v(t, r) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-a^2 \omega_n^2 t} J_0(\omega_n r).$$

求系数, 令  $t = 0$ , 得到

$$-u_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\omega_n r).$$

边界为 I 类边界条件, 所以

$$\mathcal{N}_{0,n}^2 = \frac{R^2 J_1^2(\omega_n R)}{2},$$

并且

$$\langle -u_0, J_0(\omega_n r) \rangle = -u_0 \int_0^R J_0(\omega_n r) r dr = -\frac{u_0}{\omega_n^2} \int_0^{\omega_n R} J_0(r) r dr = -\frac{u_0}{\omega_n^2} \int_0^{\omega_n R} (r J_1(r))' dr = -\frac{u_0 R J_1(\omega_n R)}{\omega_n}.$$

所以

$$-u_0 = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{2u_0}{\omega_n R J_1(\omega_n R)} J_0(\omega_n r).$$

对照得：

$$v(t, r) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{2u_0}{\omega_n R J_1(\omega_n R)} e^{-a^2 \omega_n^2 t} J_0(\omega_n r).$$

所以

$$u(t, r) = v(t, r) + u_0 = u_0 - 2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\omega_n R J_1(\omega_n R)} e^{-a^2 \omega_n^2 t} J_0(\omega_n r).$$

其中  $\omega_n$  为  $J_0(\omega R) = 0$  的所有正根。

18(1). 解下列定解问题：

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{u_r}{r} + u_{zz} = 0, & 0 < r < a, 0 < z < l \\ u(a, z) = 0, \\ u(r, 0) = 0, u(r, l) = T_0(\text{常数}). \end{cases}$$

解. 分离变量,  $u(r, z) = R(r)Z(z)$ , 有

$$-\frac{Z''}{Z} = \frac{rR'' + R'}{rR}.$$

设上式为常值  $-\mu$ , 得到固有值问题

$$\begin{cases} r^2 R'' + rR' + \mu r^2 R = 0, 0 \leq r \leq a \\ |R(0)| < \infty, R(a) = 0. \end{cases}$$

这是零阶的贝塞尔固有值问题, 因为有一个边界条件是 I 类边界条件。因而零不是固有值, 设

$$J_0(\omega a)$$

的所有正解为  $0 < \omega_1 < \omega_2 < \dots$ 。则对应固有值  $\omega_n^2$ , 固有函数  $J_0(\omega_n r)$ , 将固有值带入  $Z_n$  的方程, 得到:

$$Z_n'' - \omega_n^2 Z_n = 0.$$

$Z_n = A_n e^{\omega_n z} + B_n e^{-\omega_n z}$ 。从而

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n e^{\omega_n z} + B_n e^{-\omega_n z}) J_0(\omega_n r).$$

求系数,

$$\mathcal{N}_{0,n}^2 = \frac{a^2 J_1^2(\omega_n a)}{2},$$

并且

$$\langle T_0, J_0(\omega_n r) \rangle = \frac{T_0 a J_1(\omega_n a)}{\omega_n}.$$

$$u(r, l) = T_0 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2T_0}{a \omega_n J_1(\omega_n a)} J_0(\omega_i x).$$

对照得

$$\begin{cases} A_n + B_n = 0 \\ A_n e^{\omega_n l} + B_n e^{-\omega_n l} = \frac{2T_0}{a \omega_n J_1(\omega_n a)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} A_n = \frac{2T_0}{(e^{\omega_n l} - e^{-\omega_n l})a\omega_n J_1(\omega_n a)} \\ B_n = -\frac{2T_0}{(e^{\omega_n l} - e^{-\omega_n l})a\omega_n J_1(\omega_n a)}. \end{cases}$$

从而

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2T_0}{sh(\omega_n l)a\omega_n J_1(\omega_n a)} sh(\omega_n z) J_0(\omega_n r).$$

26 在半径为1的球内求调和函数( $\Delta u = 0$ ), 使得

$$u|_{r=1} = 3 \cos(2\theta) + 1.$$

解. 仅需求解泊松方程的定解问题:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0 \\ u|_{r=1} = 3 \cos(2\theta) + 1. \end{cases}$$

注意到在边界上满足轴对称, 因而  $u$  本身也是轴对称。在球坐标系下用勒让德多项式, 解可以表示为 (P277, 第一行)

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n-1}) p_n(\cos \theta).$$

既然在球心处有定义, 所以  $B_n = 0$ . 令  $r = 1$  得到

$$3 \cos(2\theta) + 1 = \sum_{n=0}^{\infty} A_n p_n(\cos \theta) = 6 \cos^2 \theta - 2.$$

是  $\cos \theta$  的偶函数, 因而有待定系数

$$6 \cos^2 \theta - 2 = ap_2(\cos \theta) + bp_0(\cos \theta).$$

查表并解得  $a = 4, b = 0$ 。所以

$$u = 4r^2 p_2(\cos \theta) = 2r^2(3 \cos^2 \theta - 1).$$

24 把下列函数按勒让德多项式展开:

$$(1) \ x^3$$

$$(2) \ x^4$$

$$(3) \ |x|$$

解. (1) 和 (2) 用待定系数法, 得:

$$x^3 = \frac{2}{5} p_3(x) + \frac{3}{5} p_1(x).$$

$$x^4 = \frac{8}{35} p_4(x) + \frac{4}{7} p_2(x) + \frac{1}{5} p_0(x).$$

(3) 则要求系数，由于是偶函数，故不需要考虑奇数项。

$$\langle |x|, p_{2k}(x) \rangle = 2 \int_0^1 x p_{2k}(x) dx.$$

当  $k = 0$  的时候，上式等于 1。当  $k \neq 0$  的时候，上式等于

$$2 \int_0^1 x p_{2k}(x) dx = \frac{2}{2k+2} \int_0^1 p_{2k-1}(x) dx = \frac{p_{2k-2}(0) - p_{2k}(0)}{(k+1)(4k-1)}.$$

整理得

$$\langle |x|, p_{2k}(x) \rangle = \frac{2(-1)^{k-1}(2k-2)!}{2^{2k}(k-1)!(k+1)!}.$$

所以

$$|x| = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle |x|, p_{2k}(x) \rangle}{\|p_{2k}\|^2} p_{2k}(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}(4k+1)(2k-2)!}{2^{2k}(k-1)!(k+1)!} p_{2k}(x).$$

28 半球的球面保持温度  $u_0$ ，分别在下列条件下求稳定温度分布：

- (1) 底面保持零度；
- (2) 底面绝热。

解. (1) 把半球补成一个完整得球面，恒温  $= 0$ ，奇扩充，下半球面温度为  $-u_0$ ，所以

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n-1}) p_n(\cos \theta).$$

在球心处有定义，所以  $B_n = 0$ 。所以

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n p_n(\cos \theta).$$

取  $r$  等于半球得半径  $a$ ，则有

$$f(\cos \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n a^n p_n(\cos \theta),$$

其中  $f(\cos \theta) = u_0, \cos \theta \in [0, 1], f(\cos \theta) = -u_0, \theta \in [-1, 0]$ . 将  $f(\cos \theta)$  做分解，因为是奇函数，不需要考虑奇数项

$$\langle f(\cos \theta), p_{2k+1}(x) \rangle = 2u_0 \int_0^1 p_{2k+1}(x) dx = 2u_0 \frac{p_{2k}(0) - p_{2k+2}(0)}{4k+3} = \frac{2u_0(-1)^k(2k-1)!!}{(2k+2)!!}.$$

上式仅对  $k > 0$  成立，当  $k = 0$  时， $\langle f(\cos \theta), p_1(x) \rangle = u_0$ . 所以

$$f(\cos \theta) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle f(\cos \theta), p_{2k+1}(x) \rangle}{\|p_{2k+1}\|^2} p_{2k+1}(x) = \frac{3u_0}{2} + u_0 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k(2k+3)(2k-1)!!}{(2k+2)!!} p_{2k+1}(x).$$

对照得，

$$A_{2k} = 0, A_{2k+1} = \frac{(-1)^k(2k+3)(2k-1)!!}{(2k+2)!!} \frac{1}{a^{2k+1}}, A_1 = \frac{3u_0}{2} \times \frac{1}{a}.$$

所以

$$u(r, \theta) = \frac{3u_0}{2} \times \frac{r}{a} \cos \theta + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k+3)(2k-1)!!}{(2k+2)!!} \left(\frac{r}{a}\right)^{2k+1} p_{2k+1}(\cos \theta).$$

(2), 显然  $u = u_0$ .

29 半径为  $R$  厚度为  $R/2$  的空心半球, 内外球面的温度保持为

$$A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \theta \in [0, \frac{\pi}{2}],$$

底面温度为  $A/2$ , 求半空心球温度分布?

解. 我们自然得想法是把半球壳变成一个完整得球壳。底面恒温, 因而要用奇扩充, 但是温度不是零, 所以要先找个特解  $A/2$ , 然后令  $v = u - A/2$ . 此时内外球壳温度分别为

$$f(\cos \theta) = -A/2 \times \cos \theta.$$

按勒让德分解得 (待定系数)

$$f(\cos \theta) = -A/2 p_1(\cos \theta).$$

又

$$v(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n-1}) p_n(\cos \theta).$$

分别令  $r = R, R/2$  并对照得:

$$A_n = B_n = 0, n \neq 1;$$

$$A_1 R + B_1 R^{-2} = -A/2, A_1 R/2 + B_1 (R/2)^{-2} = -A/2.$$

解得

$$A_1 = -\frac{3A}{7R}, B_1 = -\frac{AR^2}{14}.$$

所以

$$v(r, \theta) = -\left(\frac{3}{7R} + \frac{R^2}{14r^2}\right) A \cos \theta.$$

所以

$$u(r, \theta) = \frac{A}{2} - \left(\frac{3}{7R} + \frac{R^2}{14r^2}\right) A \cos \theta.$$

### 3 第四章

1.用傅里叶变换解下列问题:

(1)

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0, -\infty < x < \infty, y > 0 \\ u(x, 0) = f(x), \\ \lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} u(x, y) = 0. \end{cases}$$

解. 做傅里叶变换, 设

$$U(\lambda, y) = \int_{\mathbb{R}} u(x, y) e^{i\lambda x} dx.$$

则

$$\begin{cases} -\lambda^2 U + U_{yy} = 0, -\infty < \lambda < \infty, y > 0 \\ U(\lambda, 0) = F[f]. \end{cases}$$

这是常微分方程, 解得

$$U(\lambda, y) = C_1(\lambda) e^{-\lambda y} + C_2(\lambda) e^{\lambda y}.$$

又因为当  $y \rightarrow +\infty$  时候, 为 0, 所以当  $\lambda > 0$  的时候,  $C_2(\lambda) = 0$ ; 当  $\lambda < 0$  的时候,  $C_1(\lambda) = 0$ .

即

$$U(\lambda, y) = \begin{cases} C_1(\lambda) e^{-\lambda y}, \lambda > 0, y > 0 \\ C_2(\lambda) e^{\lambda y}, \lambda < 0, y > 0. \end{cases}$$

取  $y = 0$ , 得到

$$C_1(\lambda) = \begin{cases} F[f], \lambda > 0, y > 0 \\ 0, \lambda < 0, y > 0. \end{cases}$$

以及

$$C_2(\lambda) = \begin{cases} 0, \lambda > 0, y > 0 \\ F[f], \lambda < 0, y > 0. \end{cases}$$

所以

$$U(\lambda, y) = \begin{cases} F[f] e^{-\lambda y}, \lambda > 0, y > 0 \\ F[f] e^{\lambda y}, \lambda < 0, y > 0. \end{cases}$$

用傅里叶反变换

$$u(x, y) = \frac{1}{2\pi} \left( \int_0^\infty F[f] e^{-\lambda y} e^{-i\lambda x} d\lambda + \int_{-\infty}^0 F[f] e^{\lambda y} e^{-i\lambda x} d\lambda \right).$$

如果令  $h(\lambda) = 1, \lambda > 0, h(\lambda) = 0, \lambda < 0$ , 则上式为

$$F^{-1}[F[f] \times e^{-\lambda y} h(\lambda)] + F^{-1}[F[f] \times e^{\lambda y} (1 - h(\lambda))].$$

计算

$$F^{-1}[e^{-\lambda y} h(\lambda)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty e^{-\lambda y} h(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty e^{-\lambda y} e^{-i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{-\lambda y - i\lambda x}}{-y - ix} \Big|_0^\infty = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{y + ix}.$$

计算

$$F^{-1}[e^{\lambda y} (1 - h(\lambda))] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 e^{\lambda y} e^{-i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{\lambda y - i\lambda x}}{y - ix} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{y - ix}.$$

所以

$$F^{-1}[F[f] \times e^{-\lambda y} h(\lambda)] + F^{-1}[F[f] \times e^{\lambda y} (1 - h(\lambda))] = \frac{1}{2\pi} \left( f * \frac{1}{y + ix} + f * \frac{1}{y - ix} \right) = \frac{y}{\pi} \times f * \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

即

$$u(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{f(\xi)}{(x - \xi)^2 + y^2} d\xi.$$

(2)

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(t, x), -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(0, x) = 0. \end{cases}$$

解. 先用冲量原理, 只要求

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx}, -\infty < x < \infty, t > \tau \\ v(\tau, x) = f(\tau, x) \end{cases}$$

做  $F$ -变换,  $V = F[v]$ 。得到

$$\begin{cases} V_t = -a^2 \lambda^2 V \\ V(\tau, \lambda) = F[f]. \end{cases}$$

解得

$$V = C(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t}.$$

带入  $t = \tau$ , 得

$$V(t, \lambda; \tau) = F[f] e^{-a^2 \lambda^2 (t-\tau)}.$$

反变换,

$$v(t, x; \tau) = f * \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{x^2}{4a^2(t-\tau)}} = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau, \xi) \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi.$$

由冲量原理,

$$u = \int_0^t v(t, x; \tau) d\tau = \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau, \xi) \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi d\tau.$$

(3)

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, 0 < x < \infty, t > 0 \\ u(t, 0) = \varphi(t), u(0, x) = 0, \\ u(t, +\infty) = u_x(t, +\infty) = 0 \end{cases}$$

解. 做正弦变换, 设

$$U(t, \lambda) = \int_{\mathbb{R}} u(t, x) \sin(\lambda x) dx.$$

则

$$\begin{cases} U_t = -\lambda^2 a^2 U + a^2 \lambda u(t, 0) = -\lambda^2 a^2 U + a^2 \lambda \varphi(t), -\infty < \lambda < \infty, t > 0 \\ U(0, \lambda) = 0. \end{cases}$$

从而

$$(e^{\lambda^2 a^2 t} U)_t = a^2 \lambda \varphi(t) e^{\lambda^2 a^2 t}.$$

所以由牛顿莱布尼兹公式

$$e^{\lambda^2 a^2 t} U(t, \lambda) = e^{\lambda^2 a^2 \times 0} U(0, \lambda) + \int_0^t a^2 \lambda \varphi(\tau) e^{\lambda^2 a^2 \tau} d\tau = \int_0^t a^2 \lambda \varphi(\tau) e^{\lambda^2 a^2 \tau} d\tau.$$

所以

$$U(t, \lambda) = e^{-\lambda^2 a^2 t} \int_0^t a^2 \lambda \varphi(\tau) e^{\lambda^2 a^2 \tau} d\tau = \int_0^t a^2 \lambda \varphi(t - \tau) e^{-\lambda^2 a^2 \tau} d\tau.$$

做反正弦变换得到：

$$u(t, x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \int_0^t a^2 \lambda \varphi(t - \tau) e^{-\lambda^2 a^2 \tau} d\tau \sin(\lambda x) d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^t a^2 \varphi(t - \tau) d\tau \int_{-\infty}^\infty \lambda e^{-\lambda^2 a^2 \tau} \sin(\lambda x) d\lambda.$$

计算

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty \lambda e^{-\lambda^2 a^2 \tau} \sin(\lambda x) d\lambda &= \frac{1}{i} \int_{-\infty}^\infty \lambda e^{-\lambda^2 a^2 \tau} e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{i} \int_{-\infty}^\infty \lambda e^{-(a\sqrt{\tau}\lambda - \frac{ix}{2a\sqrt{\tau}})^2 - \frac{x^2}{4a^2\tau}} d\lambda \\ &= \frac{1}{ia^2\tau} \int_{-\infty}^\infty \lambda e^{-(\lambda - \frac{ix}{2a\sqrt{\tau}})^2 - \frac{x^2}{4a^2\tau}} d\lambda \\ &= \frac{1}{ia^2\tau} \left( \int_{-\infty}^\infty (\lambda - \frac{ix}{2a\sqrt{\tau}}) e^{-(\lambda - \frac{ix}{2a\sqrt{\tau}})^2 - \frac{x^2}{4a^2\tau}} d\lambda + \int_{-\infty}^\infty \frac{ix}{2a\sqrt{\tau}} e^{-(\lambda - \frac{ix}{2a\sqrt{\tau}})^2 - \frac{x^2}{4a^2\tau}} d\lambda \right) \\ &= \frac{1}{ia^2\tau} \frac{ix}{2a\sqrt{\tau}} e^{-\frac{x^2}{4a^2\tau}} \int_{-\infty}^\infty e^{-\lambda^2} d\lambda \\ &= \frac{xe^{-\frac{x^2}{4a^2\tau}}}{2a^3\tau^{3/2}} \times \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

所以

$$u(t, x) = \frac{1}{\pi} \int_0^t a^2 \varphi(t - \tau) \frac{xe^{-\frac{x^2}{4a^2\tau}}}{2a^3\tau^{3/2}} \times \sqrt{\pi} d\tau = \frac{x}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \varphi(t - \tau) \frac{e^{-\frac{x^2}{4a^2\tau}}}{\tau^{3/2}} d\tau.$$

## 4 第五章

3 解下列定解问题：

(1)

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, (0 < x < l, t > 0) \\ u(t, 0) = u(t, l) = 0, \\ u(0, x) = \delta(x - \xi), 0 < \xi < l. \end{cases}$$

解. 用分离变量法, 定解问题是齐次的, 因而不需要齐次化, 设  $u = T(t)X(x)$ . 则有

$$T'X = a^2 TX''.$$

所以

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

左端为  $t$  的函数又端为  $x$  的函数, 所以为常数, 记为  $-\lambda$ . 得到固有值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, (0 < x < l, t > 0) \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

以及

$$T' + \lambda a^2 T = 0.$$

边界条件均为I类边界条件，由sl理论，零不是固有值，且所有固有值都大于零。解之固有值及对应固有函数为：

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n = \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), n = 1, 2, 3, \dots.$$

将固有值代入T的常微分方程，得到

$$T_n = A_n e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t}.$$

所以

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right).$$

令  $t = 0$ ，得到

$$\delta(x - \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right).$$

由傅里叶分解

$$A_n = \frac{\int_0^l \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \delta(x - \xi) dx}{\int_0^l \sin^2\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx} = \frac{2}{l} \sin\left(\frac{n\pi \xi}{l}\right).$$

所以

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \sin\left(\frac{n\pi \xi}{l}\right) e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right).$$

(2)

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, (0 < x < l, t > 0) \\ u_x(t, 0) = u_x(t, l) = 0, \\ u(0, x) = 0, u_t(0, x) = \delta(x - \xi), 0 < \xi < l. \end{cases}$$

解。用分离变量法，定解问题是齐次的，因而不需要齐次化，设  $u = T(t)X(x)$ 。则有

$$T'' X = a^2 T X''.$$

所以

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

左端为t的函数又端为x的函数，所以为常数，记为 $-\lambda$ 。得到固有值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, (0 < x < l, t > 0) \\ X'(0) = X'(l) = 0. \end{cases}$$

以及

$$T'' + \lambda a^2 T = 0.$$

边界条件均为II类边界条件  $q = 0$ ，由sl理论，零是固有值，所以  $\lambda_0 = 0, X_0 = 1$ 。其余所有固有值都大于零。解之其他固有值及对应固有函数为：

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n = \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right), n = 1, 2, 3, \dots.$$

将固有值代入  $T$  的常微分方程, 得到

$$T_0 = A_0 + B_0 t, T_n = A_n \cos\left(\frac{n\pi a t}{l}\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi a t}{l}\right).$$

所以

$$u(t, x) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} \left( A_n \cos\left(\frac{n\pi a t}{l}\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi a t}{l}\right) \right) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right).$$

令  $t = 0$ , 得到  $A_0 = A_n = 0$ , 以及

$$\delta(x - \xi) = B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{n\pi a}{l} \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right).$$

由傅里叶分解

$$B_0 = \frac{\int_0^l 1 \delta(x - \xi) dx}{\int_0^l 1^2 dx} = \frac{1}{l},$$

和当  $n \geq 1$  时

$$B_n \frac{n\pi a}{l} = \frac{\int_0^l \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \delta(x - \xi) dx}{\int_0^l \cos^2\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx} = \frac{2}{l} \cos\left(\frac{n\pi \xi}{l}\right).$$

所以当  $n \geq 1$  时,

$$B_n = \frac{2}{n\pi a} \cos\left(\frac{n\pi \xi}{l}\right).$$

$$u(t, x) = \frac{t}{l} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi a} \cos\left(\frac{n\pi \xi}{l}\right) \sin\left(\frac{n\pi a t}{l}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right).$$

6. 求下列区域内第一边值问题的格林函数:

(1) 四分之一空间:  $x > 0, y > 0$ ;

解. 设  $M_0 = (\xi, \eta, \zeta)$  处有正电荷大小为  $\varepsilon_0$  只要再对应点摆上电荷, 让在边界上电势为零即可: 在  $M_1 = (-\xi, \eta, \zeta)$  和  $M_2 = (\xi, -\eta, \zeta)$  处各摆上  $-\varepsilon_0$  得电荷, 在  $M_3 = (-\xi, -\eta, \zeta)$  处摆上大小为  $\varepsilon_0$  得电荷, 这样由对称性, 就知道边界上电势为 0, 所以格林函数

$$G(M; M_0) = \frac{1}{4\pi} \left( \frac{1}{r(M, M_0)} - \frac{1}{r(M, M_1)} - \frac{1}{r(M, M_2)} + \frac{1}{r(M, M_3)} \right);$$

(2) 上半球  $x^2 + y^2 + z^2 < a^2, z > 0$ ;

解. 设  $M_0 = (\xi, \eta, \zeta)$  处有正电荷大小为  $\varepsilon_0$  只要再对应点摆上电荷, 让在边界上电势为零即可: 在  $M_1 = (\xi, \eta, -\zeta)$  处摆上大小为  $-\varepsilon_0$  电荷, 在  $M_2 = \frac{a^2}{|OM_0|^2}(\xi, \eta, \zeta)$  处摆上  $-\frac{a}{|OM_0|}\varepsilon_0$  得电荷, 在  $M_3 = \frac{a^2}{|OM_0|^2}(\xi, \eta, -\zeta)$  处摆上大小为  $\frac{a}{|OM_0|}\varepsilon_0$  得电荷, 这样由对称性, 就知道边界上电势为 0, 所以格林函数

$$G(M; M_0) = \frac{1}{4\pi} \left( \frac{1}{r(M, M_0)} - \frac{1}{r(M, M_1)} - \frac{a}{|OM_0|} \frac{1}{r(M, M_2)} + \frac{a}{|OM_0|} \frac{1}{r(M, M_3)} \right);$$

(3) 层状空间:  $0 < z < H$ .

解. 设  $M_0 = (\xi, \eta, \zeta)$ ,  $0 < \zeta < H$  处有正电荷大小为  $\varepsilon_0$  只要再对应点摆上电荷, 让在边界上电势为零即可: 在  $M_1 = (\xi, \eta, -\zeta)$  处摆上大小为  $-\varepsilon_0$  电荷, 在  $M_{2k} = (\xi, \eta, \zeta + 2kH)$  处摆上  $\varepsilon_0$  电荷, 在  $M_{2k+1} = (\xi, \eta, -\zeta + 2kH)$  处摆上  $-\varepsilon_0$  电荷, 这样由对称性, 就知道边界上电势为 0, 所以格林函数

$$G(M; M_0) = \frac{1}{4\pi} \left( \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{r(M, M_{2k})} - \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{r(M, M_{2k+1})} \right);$$

7. 求下列平面区域内第一边值问题的格林函数:

(1) 四分之一平面:  $x > 0, y > 0$ ;

解. 设  $M_0 = (\xi, \eta)$  处有正电荷大小为  $\varepsilon_0$  只要再对应点摆上电荷, 让在边界上电势为零即可: 在  $M_1 = (-\xi, \eta)$  和  $M_2 = (\xi, -\eta)$  处各摆上  $-\varepsilon_0$  得电荷, 在  $M_3 = (-\xi, -\eta)$  处摆上大小为  $\varepsilon_0$  得电荷, 这样由对称性, 就知道边界上电势为 0, 所以格林函数

$$G(M; M_0) = \frac{1}{2\pi} \left( \ln \frac{1}{r(M, M_0)} - \ln \frac{1}{r(M, M_1)} - \ln \frac{1}{r(M, M_2)} + \ln \frac{1}{r(M, M_3)} \right);$$

(2) 上半圆盘  $x^2 + y^2 < 1, y > 0$ ;

解. 设  $M_0 = (\xi, \eta)$  处有正电荷大小为  $\varepsilon_0$ , 在  $M_1 = (\xi, -\eta)$  处摆上大小为  $-\varepsilon_0$  电荷, 在  $M_2 = \frac{1}{|OM_0|^2}(\xi, \eta)$  处摆上  $-\varepsilon_0$  得电荷, 在  $M_3 = \frac{1}{|OM_0|^2}(\xi, -\eta)$  处摆上大小为  $\varepsilon_0$  得电荷, 这样圆周上和底边上电势为 0. 所以

$$G(M; M_0) = \frac{1}{2\pi} \left( \ln \frac{1}{r(M, M_0)} - \ln \frac{1}{r(M, M_1)} - \ln \frac{1}{r(M, M_2)} + \ln \frac{1}{r(M, M_3)} \right);$$

(3)

例子1. 设平面区域  $\Omega = \{(x, y) : x + y > 0\}$ ,

求区域  $\Omega$  的格林函数;

(2) 求区域  $\Omega$  的定解问题:

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0, x + y > 0 \\ u|_{x+y=0} = \varphi(x). \end{cases}$$

解. (1). 设  $M_0 = (\xi, \eta)$  为  $\Omega$  内点, 则  $M_0$  关于  $x + y = 0$  的对称点为  $M'_0 = (-\eta, -\xi)$  所以格林函数为

$$G(M; M_0) = -\frac{1}{2\pi} (\ln r(M, M_0) - \ln r(M, M'_0)) = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{(x + \eta)^2 + (y + \xi)^2}{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}.$$

(2). 单位外法向为  $\vec{n} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ , 所以

$$\frac{\partial G}{\partial \vec{n}}|_{\xi+\eta=0} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(G_\xi + G_\eta)|_{\xi+\eta=0} = -\frac{x+y}{\pi\sqrt{2}} \frac{1}{(x-\xi)^2 + (y+\xi)^2}.$$

所以

$$u(x, y) = \frac{x+y}{\sqrt{2}\pi} \int \frac{\varphi(\xi)}{(x-\xi)^2 + (y+\xi)^2} d\xi = \frac{x+y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(\xi)}{(x-\xi)^2 + (y+\xi)^2} d\xi.$$

定理. 泊松方程边值问题:

$$\begin{cases} \Delta u = -f(x, y, z), M \in V \\ u|_{\partial V} = \varphi(x, y, z). \end{cases}$$

的解为

$$u(M) = - \int_S \varphi(M_0) \frac{\partial_{M_0} G}{\partial \vec{n}} dS + \int_V G(M; M_0) f(M_0) dM_0,$$

其中  $G = G(M; M_0)$ 。

定理. 泊松方程边值问题:

$$\begin{cases} \Delta u = -f(x, y), M \in V \\ u|_{\partial V} = \varphi(x, y). \end{cases}$$

的解为

$$u(M) = - \int_{\partial V} \varphi(M_0) \frac{\partial_{M_0} G}{\partial \vec{n}} dl + \int_V G(M; M_0) f(M_0) dM_0,$$

其中  $G = G(M; M_0)$ 。

8. 求方程  $u_t = a^2 u_{xx} + bu$  的柯西问题的基本解.

解. 即求解定解问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + bu, (-\infty < x < +\infty, t > 0) \\ u(0, x) = \delta(x). \end{cases}$$

做傅里叶变换

$$U(t, \lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t, x) e^{i\lambda x} dx.$$

则有

$$\begin{cases} U_t = -\lambda^2 a^2 U + bU, (-\infty < \lambda < +\infty, t > 0) \\ U(0, \lambda) = 1. \end{cases}$$

这是一个  $t$  常微分方程, 虽然和  $\lambda$  有关, 解之

$$U(t, \lambda) = C(\lambda) e^{-(\lambda^2 a^2 - b)t}.$$

令  $t = 0$ , 得

$$C(\lambda) = 1.$$

所以

$$U(t, \lambda) = e^{-(\lambda^2 a^2 - b)t}.$$

用傅里叶反变换

$$\begin{aligned}
 u(t, x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\lambda^2 a^2 - b)t} e^{-i\lambda x} d\lambda \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\lambda a \sqrt{t} + \frac{ix}{2a\sqrt{t}})^2 + bt - \frac{x^2}{4a^2 t}} d\lambda \\
 &= \frac{e^{bt - \frac{x^2}{4a^2 t}}}{2\pi} \times \frac{1}{a\sqrt{t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\lambda a \sqrt{t} + \frac{ix}{2a\sqrt{t}})^2} da\sqrt{t}\lambda \\
 &= \frac{e^{bt - \frac{x^2}{4a^2 t}}}{2\pi} \times \frac{1}{a\sqrt{t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda^2} d\lambda \\
 &= \frac{e^{bt - \frac{x^2}{4a^2 t}}}{2a\sqrt{\pi t}}
 \end{aligned}$$

计算这种积分就是无脑配平方。

9. 用基本解法求解下列柯西问题：

(1)

$$\begin{cases} u_t + au_x = f(t, x), (-\infty < x < +\infty, t > 0) \\ u(0, x) = \varphi(x). \end{cases}$$

解. 基本解即求定解问题

$$\begin{cases} v_t + av_x = 0, (-\infty < x < +\infty, t > 0) \\ v(0, x) = \delta(x). \end{cases}$$

做傅里叶变换

$$V(t, \lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t, x) e^{i\lambda x} dx.$$

则有

$$\begin{cases} V_t - \lambda i a V = 0, (-\infty < \lambda < +\infty, t > 0) \\ V(0, \lambda) = 1. \end{cases}$$

这是一个  $t$  常微分方程，虽然和  $\lambda$  有关，解之

$$V(t, \lambda) = C(\lambda) e^{i\lambda at}.$$

令  $t = 0$ ，得到  $C(\lambda) = 1$ ，所以

$$V(t, \lambda) = e^{i\lambda at}.$$

做傅里叶反变换，基本解

$$U(t, x) = v(t, x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda at} e^{-i\lambda x} d\lambda = \delta(x - at).$$

代入书上得公式

$$\begin{aligned} u(t, x) &= U * \varphi + \int_0^t U(t - \tau, x) * f(\tau, x) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\xi - at) \varphi(x - \xi) d\xi + \int_0^t U(t - \tau, x) * f(\tau, x) d\tau \\ &= \varphi(x - at) + \int_0^t f(\tau, x - a(t - \tau)) d\tau. \end{aligned}$$