

2018 ~ 2019 学年第 2 学期多变量微积分期中考试答案

一、(本题8分) $L_{AB} : x = 2, y = (1-t)2, z = 0, \quad t \in [0, 1]$, 则 _____ 2分

$$\int_{L_{AB}} (x+y+z)ds = \int_0^1 (2+2-2t)\sqrt{2^2}dt = 6. \quad \text{----- 4分}$$

$$\int_{L_{\widehat{BC}}} (x+y+z) ds = \int_0^{2\pi} (2 \cos t + 2 \sin t + t) \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (2 \cos t)^2 + 1} dt = 2\sqrt{5}\pi^2. \quad \text{---7分}$$

$$\int_L (x+y+z)ds = \int_{L_{AB}} (x+y+z)ds + \int_{\widehat{L_{BC}}} (x+y+z)ds = 6 + 2\sqrt{5}\pi^2. \quad \text{-----} 8\text{分}$$

三、求下列各题（每小题8分，共16分）

1. 直线 L 的方向为 $\mathbf{v}_1 = (0, \frac{1}{2}, 1)$, 设 M 在直线 L 的垂足为 $N = (1, \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}, t - \frac{1}{2})$, 则

$$\overline{MN} \perp \mathbf{v}_1 \implies \left(1, \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}, t - \frac{3}{2}\right) \cdot \left(0, \frac{1}{2}, 1\right) = 0 \implies t = 1,$$

$N = (1, 0, \frac{1}{2})$, 垂线 l 的方向 $\mathbf{v}_2 = (1, 1, -\frac{1}{2})$, 从而垂线 l 的方程为

$$\frac{x}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-\frac{1}{2}}, \text{ 或 } x = y + 1 = 2 - 2z. \quad \text{——— 4分}$$

$$\text{平面 II 的法向量 } \mathbf{n} = (1, 1, -\frac{1}{2}) \times (0, 1, 0) = (\frac{1}{2}, 0, 1),$$

平面 Π 的方程 $\frac{1}{2}x + z - 1 = 0$ 或 $x + 2z - 2 = 0$.—————8分

2. 设此点为 $M(x_0, y_0, z_0)$, ($x_0, y_0, z_0 > 0$), 则 M 处的法向为 $\mathbf{n} = (\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2})$, ——1分

在 M 处的切平面方程为 $\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0$ 或

$$\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z - 1 = 0, \quad \text{--- 3分}$$

切平面在三个坐标轴上的截距为 $\frac{a^2}{x_0}, \frac{b^2}{y_0}, \frac{c^2}{z_0}$, 则四面体的体积为 $\frac{a^2 b^2 c^2}{6x_0 y_0 z_0}$. —— 4分

求最小体积，可以用平均值不等式 $\frac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0} \geq \frac{abc}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2})^3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}abc$.

也可以用拉格朗日乘数法. 作辅助函数

$$F(x, y, z, \lambda) = \frac{1}{xyz} + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} F'_x = -\frac{1}{x^2yz} + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0, \\ F'_y = -\frac{1}{xy^2z} + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0, \\ F'_z = -\frac{1}{xyz^2} + \frac{2\lambda z}{c^2} = 0, \\ F'_{\lambda} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0, \end{array} \right.$$

解得 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3}$ 或 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$. —— 7分

即 $M(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}})$ 四面体体积最小, 这个最小体积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}abc$. —— 8分

三、(本题15分)

因为 $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 且在 $(0, 0)$ 点邻域内 $\sin(x^2 + y^2) \leq x^2 + y^2$, 则

$$0 \leq \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2) \leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{2}(x^2 + y^2)} (x^2 + y^2) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{2}},$$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 即函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续. —— 5分

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0, \quad \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$$

即 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$, 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点偏导数存在. —— 10分

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{aligned}$$

取 $y = kx$, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 上式极限为 $\frac{\sqrt{|k|}}{1 + k^2}$, 则极限不存在, 故函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不可微. —— 15分

四、(本题16分, 第1小题10分, 第2小题6分)

$$1. \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2f + x^3y^2f'_1 + x^3y \cos xy f'_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x^4yf'_1 + x^4 \cos xy f'_2 \quad \text{--- 6分}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 8x^3yf'_1 + x^3(4 \cos xy - xy \sin xy)f'_2 + 2x^4y^3f''_{11} + 3x^4y^2 \cos xy f''_{12} + x^4y \cos^2 xy f''_{22} \quad \text{--- 10分}$$

$$2. \quad \int_1^x dv \int_v^x e^{-u^2} du = \int_1^x e^{-u^2} du \int_1^u dv = \int_1^x (u-1)e^{-u^2} du \quad \text{--- 2分}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1} + (x-1)e^{-x^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x, \quad \text{--- 4分}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x. \quad \text{--- 6分}$$

五、(本题 15分)

解: (1) 求 D 内驻点, 解驻点方程组

$$\begin{cases} f'_x = 2x(1-y^2) = 0, \\ f'_y = 2y(2-x^2) = 0, \end{cases}$$

结合 $y > 0, x^2 + y^2 < 4$, 解得区域内驻点 $M_1(\sqrt{2}, 1), M_2(-\sqrt{2}, 1)$. ——————3分

$$A = f''_{xx} = 2 - 2y^2, \quad B = f''_{xy} = -4xy, \quad C = f''_{yy} = 4 - 2x^2,$$

对于驻点 $M_1, M_2, A = 0, \Delta < 0$, 由极值判别法知他们都不是函数在区域 D 的极值点, 函数在区域 D 内无极值点. $f(M_1) = f(M_2) = 2$.—————5分

(2) 在边界线 $y = 0$ 上, $f(x, 0) = x^2, f'_x(x, 0) = 2x = 0, f''_{xx}(x, 0) = 2 > 0$, 所以 $M_3(0, 0)$ 为函数在边界 $y = 0$ 上的极小值点, $f(M_3) = 0$.—————7分

(3) 在边界线 $x^2 + y^2 = 4$ 上, $f(x, \sqrt{4-x^2}) = x^4 - 5x^2 + 8$,

$$f'_x(x, \sqrt{4-x^2}) = 4x^3 - 10x = 0 \implies x = 0, x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}, \quad f''_{xx}(x, \sqrt{4-x^2}) = 12x^2 - 10,$$

$x = 0$ 时, $y = 2, f''_{xx} < 0$, 则点 $M_4(0, 2)$ 为函数在边界线 $x^2 + y^2 = 4$ 上的极大值点, $f(M_4) = 8$.—————10分

$x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}$ 时, $y = \sqrt{\frac{3}{2}}, f''_{xx} > 0$, 则点 $M_5(\sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}})$ 和点 $M_6(\sqrt{-\frac{5}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}})$ 为函数在边界线 $x^2 + y^2 = 4$ 上的极小值点, $f(M_5) = f(M_6) = \frac{7}{4}$.—————13分

(4) 因为有界闭区域上的连续函数一定有最大值和最小值. 所以函数在闭区域 D 上的最大值为 $f(0, 2) = 8$, 最小值为 $f(0, 0) = 0$.—————15分

六、(本题10分) 因为

$$[1 + x^2 + y^2] = \begin{cases} 1 + [x^2 + y^2] = 1, & 0 \leq x^2 + y^2 < 1, \\ 2, & 1 \leq x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}. \end{cases} \quad \text{—————3分}$$

积分区域 $D = D_1 \cup D_2$, $D_1 = \{0 \leq x^2 + y^2 < 1, x \leq 0, y \leq 0\}, D_2 = \{1 \leq x^2 + y^2 < \sqrt{2}, x \leq 0, y \leq 0\}$, 采用极坐标变换得

$$\begin{aligned} \iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy &= \iint_{D_1} xy dx dy + 2 \iint_{D_2} xy dx dy \quad \text{—————5分} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \sin \theta \cos \theta dr + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{\sqrt{2}} r^3 \sin \theta \cos \theta dr \quad \text{—————9分} \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}. \quad \text{—————10分} \end{aligned}$$

七、(本题10分)

解: 记 $V_1 = \{x^2 + y^2 + (z-2)^2 \leq 4\}, V_2 = \{x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9\}$, 则 $V = V_2 \setminus V_1$, 在 V_1 上作变换:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z - 2 = r \cos \theta, \quad (0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq 2)$$

$$\iiint_{V_1} (x^2 + y^2) dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^2 r^2 \sin^2 \theta \cdot r^2 \sin \theta dr = \frac{256}{15}\pi. \quad \text{—————4分}$$

在 V_2 上作变换:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z - 1 = r \cos \theta, \quad (0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq 3)$$

$$\iiint_{V_2} (x^2 + y^2) dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^3 r^2 \sin^2 \theta \cdot r^2 \sin \theta dr = \frac{1944}{15} \pi. \quad \text{--- 8分}$$

$$\iiint_V (x^2 + y^2) dV = \iiint_{V_2} (x^2 + y^2) dV - \iiint_{V_1} (x^2 + y^2) dV = \frac{1688}{15} \pi. \quad \text{--- 10分}$$

八、(本题10分)

(1) 设点 $P(x, y, z)$, 在此点的法向 $\mathbf{n} = (2x, 2y - z, 2z - y)$, 由题意知 $\mathbf{n} \cdot (0, 0, 1) = 0$, 得 $y = 2z$. 由于点 P 在椭球面上, 将其代入椭球面方程, 得点 P 的轨迹曲线 Γ :

$$x^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1. \quad \text{--- 4分}$$

(2) Σ 是椭球面 S 位于曲线 Γ 上方的部分, 其方程为 $z = \frac{y}{2} + \sqrt{1 - x^2 - \frac{3}{4}y^2}$, 其在 xoy 平面上的投影为区域 $D = \{x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1\}$.

$$z'_x = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - \frac{3}{4}y^2}} = -\frac{2x}{2z - y}, \quad z'_y = \frac{1}{2} - \frac{3y}{4\sqrt{1 - x^2 - \frac{3}{4}y^2}} = \frac{z - 2y}{2z - y}, \quad \text{--- 6分}$$

$$\left(\text{或 } F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1 \implies z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{2x}{2z - y}, \quad z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{z - 2y}{2z - y}, \right)$$

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} dx dy = \frac{1}{|2z - y|} \sqrt{5z^2 + 5y^2 + 4x^2 - 8yz} dx dy \quad (\text{利用椭球面方程}) \\ &= \frac{1}{|2z - y|} \sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz} dx dy \quad \text{--- 8分} \end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS = \iint_D (x + \sqrt{3}) dx dy = \iint_D \sqrt{3} dx dy = \sqrt{3}\pi \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\pi. \quad \text{--- 10分}$$